

Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie (v.1.0 ; 2021)

Synthèse réalisée grâce au soutien financier du Fond européen de développement régional (FEDER), de l'État (DREAL Occitanie), de la Région Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ce document présente la liste de référence des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de la région Occitanie (suivant la stratégie régionale relative aux plantes exotiques envahissantes d'Occitanie, coordonnée par les Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et pyrénéen). Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v.12 ([Gargominy et al., 2018](#)).

Légende : Type : ES = espèce, SSES = sous-espèce, VAR = variété / Catégorie : MAJ = Majeure, MOD = Modérée, ÉME = Émergente, AL = Alerte, PREV = Prévention / Statut d'envahissement : [hors plantations] = caractère envahissant s'exprimant hors plantations (de phanérophytes en général).

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hvbride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|---------------|------|---------|------------------------|
| 79710 | <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | Fabaceae | ES | | PREV |
| 610708 | <i>Andropogon virginicus</i> L., 1753 | Poaceae | ES | | PREV |
| 161030 | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788 | Sapindaceae | ES | | PREV |
| 20000585 | <i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf | Poaceae | ES | | PREV |
| 20000586 | <i>Ehrharta calycina</i> Sm. | Poaceae | ES | | PREV |
| 100603 | <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805 | Gunneraceae | ES | | PREV |
| 20000587 | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC. | Asteraceae | ES | | PREV |
| 160257 | <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841 | Apiaceae | ES | | PREV |
| 20000090 | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944 Manden., 1944 | Apiaceae | ES | | PREV |
| 20000588 | <i>Lespedeza cuneata</i> G.Don | Fabaceae | ES | | PREV |
| 20000589 | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | Lygodiaceae | ES | | PREV |
| 610602 | <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John | Araceae | ES | | PREV |
| 20000092 | <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus, 1922 | Poaceae | ES | | PREV |
| 446978 | <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | PREV |
| 20000091 | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross, 1913 | Polygonaceae | ES | | PREV |
| 448319 | <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825 | Fabaceae | ES | | PREV |
| 532918 | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | Fabaceae | VAR | | PREV |
| 637107 | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933 | Euphorbiaceae | ES | | PREV |
| 81955 | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | Amaranthaceae | ES | | MOD |
| 81978 | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | Amaranthaceae | ES | | MOD |
| 81992 | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | Amaranthaceae | ES | | MOD |
| 82018 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | Amaranthaceae | ES | | MOD |
| 83938 | <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 86167 | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | Poaceae | ES | | MOD |
| 86564 | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | Poaceae | ES | | MOD |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|------------------|------|---------|------------------------|
| 89452 | <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carriere, 1855 [hors plantations] | Pinaceae | ES | | MOD |
| 93020 | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 93129 | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 93923 | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | Cyperaceae | ES | | MOD |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | Solanaceae | ES | | MOD |
| 611753 | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 | Amaranthaceae | ES | | MOD |
| 95965 | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788 | Poaceae | ES | | MOD |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Hydrocharitaceae | ES | | MOD |
| 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 96746 | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 96749 | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 96775 | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 97571 | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | Euphorbiaceae | ES | | MOD |
| 97623 | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | Euphorbiaceae | ES | | MOD |
| 99359 | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 100330 | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753 | Fabaceae | ES | | MOD |
| 101055 | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 101056 | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | Asteraceae | ES | X | MOD |
| 103543 | <i>Impatiens balfouri</i> Hook.f., 1903 | Balsaminaceae | ES | | MOD |
| 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | Juncaceae | ES | | MOD |
| 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Araceae | ES | | MOD |
| 105615 | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | Brassicaceae | ES | | MOD |
| 106571 | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | Caprifoliaceae | ES | | MOD |
| 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 109911 | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | Onagraceae | ES | | MOD |
| 109926 | <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875 | Onagraceae | ES | | MOD |
| 110139 | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772 | Fabaceae | ES | | MOD |
| 111863 | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798 | Oxalidaceae | ES | | MOD |
| 111881 | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794 | Oxalidaceae | ES | | MOD |
| 111897 | <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822 | Oxalidaceae | ES | | MOD |
| 112100 | <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900 | Poaceae | ES | | MOD |
| 112111 | <i>Panicum capillare</i> L., 1753 | Poaceae | ES | | MOD |
| 112130 | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | Poaceae | ES | | MOD |
| 112463 | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | Vitaceae | ES | | MOD |
| 112790 | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.Lepez, 1986 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 113418 | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | Phytolaccaceae | ES | | MOD |
| 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 [hors plantations] | Pinaceae | ES | | MOD |
| 138843 | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 [hors plantations] | Pinaceae | SSES | | MOD |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

Conservatoire Botanique National



Conservatoire Botanique National



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|---|------------------|------|---------|------------------------|
| 114024 | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Menchh., 1770 [hors plantations] | Platanaceae | ES | X | MOD |
| 115167 | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 [hors plantations] | Salicaceae | ES | X | MOD |
| 116053 | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 [hors plantations] | Rosaceae | ES | | MOD |
| 116089 | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | Rosaceae | ES | | MOD |
| 116485 | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 | Rosaceae | ES | | MOD |
| 124025 | <i>Solanum chenopodoides</i> Lam., 1794 | Solanaceae | ES | | MOD |
| 124164 | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Poaceae | ES | | MOD |
| 125333 | <i>Sympyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 125337 | <i>Sympyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | Asteraceae | ES | X | MOD |
| 125391 | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | Oleaceae | ES | | MOD |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Plantaginaceae | ES | | MOD |
| 129959 | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | Vitaceae | ES | | MOD |
| 130491 | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MOD |
| 79691 | <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822 | Fabaceae | ES | | MAJ |
| 79766 | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | Sapindaceae | ES | | MAJ |
| 80383 | <i>Agave americana</i> L., 1753 | Asparagaceae | ES | | MAJ |
| 80824 | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | Simaroubaceae | ES | | MAJ |
| 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MAJ |
| 82164 | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | Fabaceae | ES | | MAJ |
| 83469 | <i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818 | Apocynaceae | ES | | MAJ |
| 84057 | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | Asteraceae | ES | | MAJ |
| 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | MAJ |
| 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | Scrophulariaceae | ES | | MAJ |
| 89211 | <i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927 | Aizoaceae | ES | | MAJ |
| 89212 | <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926 | Aizoaceae | ES | | MAJ |
| 92572 | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | Poaceae | ES | | MAJ |
| 95831 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753 | Elaeagnaceae | ES | | MAJ |
| 103547 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | Balsaminaceae | ES | | MAJ |
| 106252 | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935 | Linderniaceae | ES | | MAJ |
| 612513 | <i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | Onagraceae | SSES | | MAJ |
| 612514 | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | Onagraceae | SSES | | MAJ |
| 106800 | <i>Lupinus x regalis</i> Bergmans, 1924 | Fabaceae | ES | X | MAJ |
| 110781 | <i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812 | Cactaceae | ES | | MAJ |
| 112482 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | Poaceae | ES | | MAJ |
| 112483 | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759 | Poaceae | ES | | MAJ |
| 117503 | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | Polygonaceae | ES | | MAJ |
| 117505 | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922 | Polygonaceae | ES | | MAJ |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

Conservatoire Botanique National



Conservatoire Botanique National



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|------------------|------|---------|------------------------|
| 117507 | Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkove, 1983 | Polygonaceae | ES | X | MAJ |
| 117860 | Robinia pseudoacacia L., 1753 | Fabaceae | ES | | MAJ |
| 120582 | Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888 | Solanaceae | ES | | MAJ |
| 122630 | Senecio inaequidens DC., 1838 | Asteraceae | ES | | MAJ |
| 612629 | Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 | Asteraceae | SSES | | MAJ |
| 81831 | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 | Amaranthaceae | ES | | ÉME |
| 610847 | Ambrosia psilostachya DC., 1836 | Asteraceae | ES | | ÉME |
| 82092 | Ambrosia tenuifolia Spreng., 1826 | Asteraceae | ES | | ÉME |
| 82093 | Ambrosia trifida L., 1753 | Asteraceae | ES | | ÉME |
| 85469 | Azolla filiculoides Lam., 1783 | Salviniaceae | ES | | ÉME |
| 86975 | Bunias orientalis L., 1753 | Brassicaceae | ES | | ÉME |
| 610664 | Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 | Cabombaceae | ES | | ÉME |
| 92793 | Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 | Crassulaceae | ES | | ÉME |
| 93924 | Cyperus esculentus L., 1753 | Cyperaceae | ES | | ÉME |
| 94011 | Cyperus rotundus L., 1753 | Cyperaceae | ES | | ÉME |
| 94142 | Cytisus multiflorus (L'Her.) Sweet, 1826 | Fabaceae | ES | | ÉME |
| 94168 | Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944 | Fabaceae | ES | | ÉME |
| 95823 | Egeria densa Planch., 1849 | Hydrocharitaceae | ES | | ÉME |
| 95983 | Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 | Hydrocharitaceae | ES | | ÉME |
| 96591 | Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, 1841 | Poaceae | ES | | ÉME |
| 717180 | Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | Phrymaceae | ES | | ÉME |
| 101286 | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 | Apiaceae | ES | | ÉME |
| 136646 | Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, 1952 | Elaeagnaceae | SSES | | ÉME |
| 103030 | Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 | Cannabaceae | ES | | ÉME |
| 103139 | Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 | Araliaceae | ES | | ÉME |
| 104805 | Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 | Hydrocharitaceae | ES | | ÉME |
| 105869 | Leycesteria formosa Wall., 1824 | Caprifoliaceae | ES | | ÉME |
| - | Lycium ferocissimum Miers | Solanaceae | ES | | ÉME |
| 109141 | Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 | Haloragaceae | ES | | ÉME |
| 109144 | Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 | Haloragaceae | ES | | ÉME |
| 112712 | Periploca graeca L., 1753 | Apocynaceae | ES | | ÉME |
| 718746 | Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Melgura, 2012 | Verbenaceae | VAR | | ÉME |
| 447733 | Pistia stratiotes L., 1753 | Araceae | ES | | ÉME |
| 116137 | Prunus serotina Ehrh., 1784 | Rosaceae | ES | | ÉME |
| 119854 | Sagittaria latifolia Willd., 1805 | Alismataceae | ES | | ÉME |
| 446498 | Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972 | Salviniaceae | ES | | ÉME |
| 122545 | Senecio angulatus L.f., 1782 | Asteraceae | ES | | ÉME |
| 630704 | Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813 | Poaceae | ES | | ÉME |
| 124646 | Spiraea japonica L.f., 1782 | Rosaceae | ES | | ÉME |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|-----------------|------|---------|------------------------|
| 79684 | Abutilon theophrasti Medik., 1787 | Malvaceae | ES | | AL |
| 79707 | Acacia retinodes Schltdl., 1847 | Fabaceae | ES | | AL |
| 79877 | Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802 | Asteraceae | ES | | AL |
| 79890 | Achillea filipendulina Lam., 1783 | Asteraceae | ES | | AL |
| 447347 | Albizia julibrissin Durazz., 1772 | Fabaceae | ES | | AL |
| 81567 | Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 | Betulaceae | ES | | AL |
| 81570 | Alnus incana (L.) Moench, 1794 | Betulaceae | ES | | AL |
| 81595 | Aloe maculata All., 1773 | Asphodelaceae | ES | | AL |
| 81963 | Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 | Amaranthaceae | ES | | AL |
| 788854 | Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth, 2006 | Poaceae | ES | | AL |
| 82120 | Ammannia coccinea Rottb., 1773 | Lythraceae | ES | | AL |
| 446987 | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957 | Basellaceae | ES | | AL |
| 83235 | Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, 1928 | Aizoaceae | ES | | AL |
| 84251 | Asclepias syriaca L., 1753 | Apocynaceae | ES | | AL |
| 84269 | Asparagus asparagoides (L.) Druce, 1914 | Asparagaceae | ES | | AL |
| 131756 | Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753 | Asparagaceae | SSES | | AL |
| 85068 | Atriplex halimus L., 1753 | Amaranthaceae | ES | | AL |
| 85631 | Bassia scoparia (L.) Voss, 1903 | Amaranthaceae | ES | | AL |
| 608062 | Bidens bipinnata L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 85949 | Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803 | Asteraceae | ES | | AL |
| 85972 | Bidens pilosa L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 85981 | Bidens subalternans DC., 1836 | Asteraceae | ES | | AL |
| 86448 | Brassica tournefortii Gouan, 1773 | Brassicaceae | ES | | AL |
| 86513 | Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 | Poaceae | ES | | AL |
| 86817 | Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 | Moraceae | ES | | AL |
| 87696 | Campanula portenschlagiana Roem. & Schult., 1819 | Campanulaceae | ES | | AL |
| 631143 | Campsis radicans (L.) Bureau, 1864 | Bignoniaceae | ES | | AL |
| 88956 | Carex vulpinoidea Michx., 1803 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 89221 | Carthamus caeruleus L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 89323 | Catalpa bignonioides Walter, 1788 | Bignoniaceae | ES | | AL |
| 160921 | Celtis occidentalis L., 1753 | Cannabaceae | ES | | AL |
| 717122 | Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963 | Poaceae | ES | | AL |
| 717123 | Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 | Poaceae | ES | | AL |
| 89506 | Centaurea acaulis L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 89582 | Centaurea diluta Aiton, 1789 | Asteraceae | ES | | AL |
| 90111 | Cerastium tomentosum L., 1753 | Caryophyllaceae | ES | | AL |
| 92222 | Commelina communis L., 1753 | Commelinaceae | ES | | AL |
| 717150 | Cotoneaster coriaceus Franch., 1890 | Rosaceae | ES | | AL |
| 92654 | Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912 | Rosaceae | ES | | AL |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

Conservatoire Botanique National



Conservatoire Botanique National



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|----------------|------|---------|------------------------|
| 92663 | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | Rosaceae | ES | | AL |
| 92722 | <i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853 | Asteraceae | ES | | AL |
| 93200 | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932 | Iridaceae | ES | X | AL |
| 93613 | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | Convolvulaceae | ES | | AL |
| 93718 | <i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coul., 1894 | Amaranthaceae | ES | | AL |
| 93783 | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 93918 | <i>Cyperus difformis</i> L., 1756 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 93938 | <i>Cyperus glomeratus</i> L., 1756 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 93954 | <i>Cyperus involucratus</i> Rottb., 1772 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 94007 | <i>Cyperus reflexus</i> Vahl, 1805 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 94479 | <i>Datura ferox</i> L., 1756 | Solanaceae | ES | | AL |
| 611231 | <i>Datura wrightii</i> Regel, 1859 | Solanaceae | ES | | AL |
| 94560 | <i>Delairea odorata</i> Lem., 1844 | Asteraceae | ES | | AL |
| 94919 | <i>Dichondra micrantha</i> Urb., 1924 | Convolvulaceae | ES | | AL |
| 95048 | <i>Diospyros lotus</i> L., 1753 | Ebenaceae | ES | | AL |
| 619297 | <i>Echinochloa hispidula</i> (Retz.) Nees ex Royle, 1840 | Poaceae | ES | | AL |
| 146305 | <i>Echinochloa muricata</i> var. <i>microstachya</i> Wiegand, 1921 | Poaceae | VAR | | AL |
| 95681 | <i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinger) Vasinger, 1934 | Poaceae | ES | | AL |
| 95682 | <i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch, 1891 | Poaceae | ES | | AL |
| 95806 | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771 | Asteraceae | ES | | AL |
| 95829 | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883 | Pontederiaceae | ES | | AL |
| 95877 | <i>Elatine triandra</i> Schkuhr, 1791 | Elatinaceae | ES | | AL |
| 95891 | <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) C.Presl, 1828 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 95895 | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840 | Cyperaceae | ES | | AL |
| 95975 | <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792 | Poaceae | ES | | AL |
| 96143 | <i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831 | Onagraceae | ES | | AL |
| 96149 | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | Onagraceae | ES | | AL |
| 96624 | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841 | Poaceae | ES | | AL |
| 96644 | <i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830 | Poaceae | ES | | AL |
| 96745 | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941 | Asteraceae | ES | | AL |
| 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | Asteraceae | ES | | AL |
| 448138 | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | Celastraceae | ES | | AL |
| 611146 | <i>Euphorbia davidii</i> Subils, 1984 | Euphorbiaceae | ES | | AL |
| 97594 | <i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816 | Euphorbiaceae | ES | | AL |
| 97666 | <i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817 | Euphorbiaceae | ES | | AL |
| 97961 | <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | Polygonaceae | ES | | AL |
| 98933 | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | Oleaceae | ES | | AL |
| 99260 | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | Fabaceae | ES | | AL |
| 99358 | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | Asteraceae | ES | | AL |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|---|------------------|------|---------|------------------------|
| 619555 | <i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991 | Asteraceae | ES | | AL |
| 99700 | <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn., 1791 | Asteraceae | ES | | AL |
| 611295 | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841 | Asteraceae | ES | | AL |
| 159690 | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | Poaceae | ES | | AL |
| 101141 | <i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753 | Heliotropiaceae | ES | | AL |
| 101237 | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | Asphodelaceae | ES | | AL |
| 103557 | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | Balsaminaceae | ES | | AL |
| 103684 | <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917 | Convolvulaceae | ES | | AL |
| 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | Fabaceae | ES | | AL |
| 851941 | <i>Lantana x strigocamara</i> R.W.Sanders, 2006 | Verbenaceae | ES | X | AL |
| 137097 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | Asteraceae | SSES | | AL |
| 105689 | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | Brassicaceae | ES | | AL |
| 105960 | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | Oleaceae | ES | | AL |
| 106575 | <i>Lonicera nitida</i> E.H.Wilson, 1911 | Caprifoliaceae | ES | | AL |
| 106965 | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | Solanaceae | ES | | AL |
| 106969 | <i>Lycium europaeum</i> L., 1753 | Solanaceae | ES | | AL |
| 107575 | <i>Medicago arborea</i> L., 1753 | Fabaceae | ES | | AL |
| 108642 | <i>Misanthus sinensis</i> Andersson, 1855 | Poaceae | ES | | AL |
| 108810 | <i>Morus alba</i> L., 1753 | Moraceae | ES | | AL |
| 109207 | <i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870 | Hydrocharitaceae | ES | | AL |
| 717324 | <i>Najas indica</i> (Willd.) Cham., 1829 | Hydrocharitaceae | ES | | AL |
| - | <i>Nassella longiglumis</i> (Phil.) Barkworth | Poaceae | ES | | AL |
| 109379 | <i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 | Poaceae | ES | | AL |
| 161809 | <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990 | Poaceae | ES | | AL |
| 109381 | <i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack., 1894 | Poaceae | ES | | AL |
| 109608 | <i>Nicotiana glauca</i> Graham, 1828 | Solanaceae | ES | | AL |
| 109711 | <i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth, 1843 | Amaryllidaceae | ES | | AL |
| 717334 | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 | Onagraceae | ES | | AL |
| 109956 | <i>Oenothera rosea</i> L'Her. ex Aiton, 1789 | Onagraceae | ES | | AL |
| 110268 | <i>Onopordum tauricum</i> Willd., 1803 | Asteraceae | ES | | AL |
| 610564 | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850 | Cactaceae | ES | | AL |
| 110758 | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768 | Cactaceae | ES | | AL |
| 111793 | <i>Oryza sativa</i> L., 1753 | Poaceae | ES | | AL |
| 111823 | <i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl., 1943 | Asteraceae | ES | | AL |
| 111910 | <i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753 | Oxalidaceae | ES | | AL |
| 112467 | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | Vitaceae | ES | | AL |
| 112536 | <i>Passiflora caerulea</i> L., 1753 | Passifloraceae | ES | | AL |
| 112560 | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841 | Paulowniaceae | ES | | AL |
| 149336 | <i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L., 1753 | Poaceae | VAR | | AL |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

Conservatoire Botanique National



Conservatoire Botanique National



Liste de référence PEE de la région Occitanie

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|--|----------------|------|---------|------------------------|
| 113134 | <i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753 | Hydrangeaceae | ES | | AL |
| 113248 | <i>Phoenix canariensis</i> hort. ex Chabaud, 1882 | Arecaceae | ES | | AL |
| 611604 | <i>Phyllostachys aurea</i> Carriere ex Riviere & C.Riviere, 1878 | Poaceae | ES | | AL |
| 113785 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 | Pittosporaceae | ES | | AL |
| 115122 | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785 | Salicaceae | ES | | AL |
| 115527 | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904 | Rosaceae | ES | | AL |
| 115575 | <i>Potentilla norvegica</i> L., 1753 | Rosaceae | ES | | AL |
| 116054 | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753 | Rosaceae | ES | | AL |
| 116289 | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834 | Juglandaceae | ES | | AL |
| 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | Fagaceae | ES | | AL |
| 139954 | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | Ericaceae | SSES | | AL |
| 117723 | <i>Rhus typhina</i> L., 1756 | Anacardiaceae | ES | | AL |
| 119474 | <i>Rumex cristatus</i> DC., 1813 | Polygonaceae | ES | | AL |
| 718282 | <i>Saccharum spontaneum</i> subsp. <i>aegyptiacum</i> (Willd.) Hack., 1889 | Poaceae | SSES | | AL |
| 120691 | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | Lamiaceae | ES | | AL |
| 120703 | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | Lamiaceae | ES | | AL |
| 120875 | <i>Sarracenia purpurea</i> L., 1753 | Sarraceniaceae | ES | | AL |
| 123138 | <i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen, 1987 | Poaceae | ES | | AL |
| 123182 | <i>Sicyos angulata</i> L., 1753 | Cucurbitaceae | ES | | AL |
| 123799 | <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753 | Brassicaceae | ES | | AL |
| 124020 | <i>Solanum bonariense</i> L., 1753 | Solanaceae | ES | | AL |
| 124023 | <i>Solanum carolinense</i> L., 1753 | Solanaceae | ES | | AL |
| 124036 | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795 | Solanaceae | ES | | AL |
| 124106 | <i>Solanum sarachoides</i> Sendtn., 1846 | Solanaceae | ES | | AL |
| - | <i>Solanum viarum</i> Dunal | Solanaceae | ES | | AL |
| 124214 | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794 | Asteraceae | ES | | AL |
| 124682 | <i>Spiraea x billardii</i> Herincq, 1857 | Rosaceae | ES | | AL |
| 611571 | <i>Sporobolus cryptandrus</i> A.Gray, 1848 | Poaceae | ES | | AL |
| 124756 | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | Lamiaceae | ES | | AL |
| 125330 | <i>Symphytum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | Asteraceae | ES | | AL |
| 125356 | <i>Symphytum orientale</i> L., 1753 | Boraginaceae | ES | | AL |
| 125369 | <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855 | Boraginaceae | ES | X | AL |
| 125404 | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753 | Asteraceae | ES | | AL |
| 125437 | <i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828 | Tamaricaceae | ES | | AL |
| 126829 | <i>Tordylium apulum</i> L., 1753 | Apiaceae | ES | | AL |
| 126930 | <i>Trachelium caeruleum</i> L., 1753 | Campanulaceae | ES | | AL |
| 126933 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862 | Arecaceae | ES | | AL |
| 128748 | <i>Verbena bonariensis</i> L., 1753 | Verbenaceae | ES | | AL |
| 706912 | <i>Verbena brasiliensis</i> Vell., 1829 | Verbenaceae | ES | | AL |

Cottaz C. & Dao J. (coord.)

version 1.0 ; mars 2021

| Code réf (TAXREF) | Nom complet | Famille | Rang | Hybride | Catégorie Occitanie |
|----------------------|---|----------------|------|---------|------------------------|
| 717695 | Verbena incompta P.W.Michael, 1995 | Verbenaceae | ES | | AL |
| 128863 | Veronica filiformis Sm., 1791 | Plantaginaceae | ES | | AL |
| 128954 | Veronica peregrina L., 1753 | Plantaginaceae | ES | | AL |
| 129961 | Vitis rupestris Scheele, 1848 | Vitaceae | ES | | AL |
| 116211 | x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925 | Poaceae | ES | X | AL |
| 130584 | Yucca gloriosa L., 1753 | Asparagaceae | ES | | AL |
| 130691 | Zygophyllum fabago L., 1753 | Zygophyllaceae | ES | | AL |